

Información para la Salud



**VIH-Sida y
Embarazo**

Si estás Embarazada realízate un Análisis de VIH

Con los controles y tratamientos adecuados se puede evitar la transmisión del virus de madre a hijo.

Transmisión vertical

Una de las formas de transmisión del virus del VIH es de la madre al hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia. A esta forma se la conoce como **transmisión vertical**.

Por eso es muy importante que la mujer embarazada sepa si está infectada o no y se realice los controles necesarios para cuidarse y proteger a su bebé. Se recomienda que también la pareja de la mujer embarazada se haga el test de VIH ya que puede transmitirle el virus durante el embarazo

La legislación argentina garantiza la cobertura integral de los servicios sanitarios para las personas que viven con el virus VIH/SIDA.

Osplad, como todos los hospitales públicos y obras sociales del país, cubre el 100% del análisis del VIH/SIDA y la asistencia posterior en caso de un resultado positivo.

Detección precoz

Actualmente en la Argentina todavía nacen entre 70 y 100 bebés por año con VIH. Esto se debe a que más de la mitad de las mujeres no se controlan debidamente durante el embarazo: pueden tener VIH, no saberlo y transmitírselo a sus bebés.

A través de la detección precoz, y con un adecuado tratamiento entre los 3 y 6 meses de embarazo, la mujer embarazada con VIH tiene un 98% de probabilidades de que su bebé nazca sano.



Salud



Bienestar



Protección



Conf

para la Salud

Cuando la madre está infectada

Si queremos reducir drásticamente el impacto del VIH en la niñez, debemos comenzar por el cuidado de las mujeres embarazadas, detectar a tiempo la infección y ofrecer un tratamiento adecuado.

Cuando el médico sabe que una mujer es VIH positiva, puede evitar usar procedimientos que incrementan la exposición del feto a la sangre de la madre durante el embarazo o el parto, tales como la amniocentesis o el muestreo de sangre del cuero cabelludo del feto, o que podrían romper las membranas que rodean al bebé.

Como también existe riesgo de infección durante la lactancia, se recomienda a las mamás con VIH no amamantar sus hijos y utilizar, en cambio, leche maternizada.

Antes de quedar embarazada

- Es fundamental que toda mujer que quiera quedar embarazada o que ya lo esté, se realice el test del VIH, también **es importante que se lo haga su pareja.**
- Se debe evitar usar agujas, máquinas de afeitar u otros elementos que pudieran estar contaminados con la sangre de una persona infectada.
- Es conveniente evitar el contacto sexual con alguien infectado; el uso de preservativos ayuda a proteger contra el VIH y otras infecciones de transmisión sexual.

Usá siempre preservativo

lactancia



Cuidado



Prevención



Experiencia

Informes:
Área de Patologías Especiales
Paraguay 2053 Capital Federal
Tel. 011-5246-5100

**Servicio de Obstetricia
del Policlínico del Docente**
Lavalle 1974 Capital Federal.
Tel. 011-5218-7100

FUNDACIÓN HUESPED
0-800-222-HUESPED (4837)
Pasaje Angel Peluffo 3932 (C1202ABB)C.A. de Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: (5411) 4981 7777
info@huesped.org.ar



Dirección de Sida y ETS
LA SALUD ES UN DERECHO DE TODOS Y TODAS



Ministerio de
Salud
Presidencia de la Nación

Linea Pregunte SIDA 0800 - 3333 - 444
www.msal.gov.ar/sida



[direcciondesida](https://www.facebook.com/direcciondesida)



[direcciondesida](https://twitter.com/direcciondesida)



[direcciondesida](https://www.youtube.com/direcciondesida)



[direcciondesida](https://plus.google.com/direcciondesida)

Policlínico
DEL *docente*

 **PREVENCIÓN**

www.osplad.org.ar/prevencion

ICDC INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
Y DOCENCIA DE OSPLAD


Experiencia y Solidaridad
OSPLAD
OBRA SOCIAL PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE



Atención al beneficiario desde todo el país

0810-666-7752
LUNES A VIERNES DE 8 A 20

info@osplad.org.ar
www.osplad.org.ar

SSSalud
SUPERINTENDENCIA
DE SERVICIOS DE SALUD

0-800-222-SALUD (72583)
www.sssalud.gov.ar

OSPLAD
OBRA SOCIAL PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE INOS 0-6-116-3