


Alerta Epidemiológica por Sarampión

El Sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que puede causar complicaciones graves, se caracteriza por:



- Fiebre Alta
- Tos
- Congestión Nasal
- Erupción en Piel (Exantema)
- Ojos Llorosos o Enrojecidos
- La presentación puede modificarse ante Personas Vacunadas

Se transmite de persona a persona, a través de las gotas de aire de nariz, boca o garganta de una persona infectada. El virus puede permanecer en el aire o en las superficies durante 2 hs.



- **Mayores de 5 años, adolescentes y adultos:** deben acreditar **2 dosis vacuna con componente contra el sarampión** (monovalente, doble o triple viral) aplicada después del año de vida o contar con **serología IgG positiva** para sarampión confirmada por laboratorio.



- Las personas **nacidas antes del año 1965** se consideran inmunes, es decir, no necesitan vacunarse.

- La vacunación es la **única medida efectiva** para prevenirlo. Es **obligatoria y gratuita** en todos los vacunatorios y hospitales públicos del país.



- Si se **viaja a zonas de riesgo** chequear que todos estén **vacunados contra el sarampión**.

- **Controlar el Calendario de Vacunación** de Niñas/os, Adolescentes y Adultas/os.
- **Entre los 12 meses y los 5 años** deben acreditar una dosis de vacuna **triple viral** (sarampión, papera y rubeola) / **doble viral** (sarampión y rubeola)

Más información sobre Recomendaciones de vacunación del Ministerio de Salud de la Nación

<https://www.argentina.gob.ar/salud/sarampion>



Calendario Nacional de Vacunación 2025

<https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2025-01-v2-calendario-nacional-vacunacion.pdf>



¡Cuidemos entre todos/as a los más vulnerables!

Contraindicaciones y advertencias:



- **Las embarazadas no pueden vacunarse.** Evitar el embarazo en los 30 días posteriores a la vacunación.



- **Niños/as menores de 6 meses, no pueden vacunarse.**

- **Alergia grave a la vacuna (anafilaxia)** a componentes de la vacuna triple viral.



- **Inmunosupresión:** congénita o adquirida (drogas, transplante, enfermedad oncológica), infección por VIH con recuento de CD4 < 15%.